

# مراقبت دارویی تاکسوتر

## خودمراقبتی در منزل

## آموزش به بیمار

### داروی تاکسوتر چیست؟



جزو داروهای شیمی درمانی است که امروزه به طور گسترده به تنهایی و یا در ترکیب با سایر داروها برای درمان سرطان استفاده می‌شود. تحقیقات نشان داده است که تاکسوتر در مقایسه با سایر داروهای شیمی درمانی تاثیر بیشتری در افزایش بقای بیمار و همچنین افزایش سرعت درمان برخی از تومورها دارد. این دارو بدلیل اینکه یک داروی شیمی درمانی قوی است عوارض جانبی متعددی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به تهوع، استفراغ و آلوپسی (ریزش مو) موفقیت اشاره کرد

### منع مصرف :

۱. در زنان باردار( این دارو می‌تواند به جنین آسیب برساند و یا باعث نقص تولد نوزاد شود اگر شما از این دارو استفاده می‌کنید حتما پزشک خود را در جریان قرار دهید)
۲. حین شردهی
۳. افرادی که بیماری شدید کبدی دارند
۴. افرادی که حساسیت شدید به الکل دارند
۵. حساسیت به تاکسوتر یا هر یک از اجزای این دارو

### احتیاطات:

۱. در افراد مبتلا و یا با سابقه صرع با احتیاط تجویز میگردد.
۲. قبل از تزریق این دارو آزمایش بررسی فاکتورهای خونی و آنزیم های کبدی الزامی است
۳. به علت تاثیر روی توان باروری آقایان، باید قبل از شروع درمان با دارو نسبت به ذخیره اسپرم اقدام نمایند و تا شش ماه پس از درمان نباید نسبت به بچه دار شدن اقدام کنند.
۴. روز قبل و تا دو روز پس از تزریق از یک کورتیکواستروئید مثل دگزامتازون برای کاهش عوارض دارو مثل واکنش آلرژیک ، احتباس مایع ، ورم دست و پا و افزایش وزن استفاده میگردد که توسط پزشک برای شما تجویز میگردد.

### دوز و کورس دارو:

بر اساس نسبت وزن به قد و با محاسبه سطح بدن تان توسط پزشک تعیین میگردد.

معمولا هر دو تا سه هفته یکبار ( البته دوز دارو و توالی تزریق بر اساس نتایج آزمایشگاهی ، وضعیت عمومی بیمار و میزان پاسخ به درمان میتواند توسط پزشک تغییر کند.) تزریق میشود.

این دارو به سرعت در بافت های بدن توزیع و دفع آن عمدتاً از طریق کبد در مدفوع می باشد. تنها ۶٪ از طریق ادرار دفع میشود.

## عوارض دارو:

عوارض حاد: به صورت واکنش آلرژیک یا بیش حساسیتی، خارش، تنگی نفس، تب و لرز، افت فشار خون، و درد پشت خود را نشان میدهد.

عوارض بسیار شایع: کاهش گلوبول سفید و گلوبول قرمز خون، ریزش مو، تهوع، زخم دهان، اسهال، خستگی، بی حسی اندام ها به صورت گزگز انگشتان، تغییر یا قطع عادت ماهانه....

در صورت بروز تاری دید و مشکلات پیش رونده تنفسی سریعاً به پزشک مراجعه شود.

در صورت بروز درد شکمی، اسهال، خون ریزی از مقعد و خون در مدفوع، احتمال سمیت دستگاه گوارش وجود دارد در نتیجه دارو با نظر پزشک بایستی با احتیاط مصرف گردد.

التهاب، واکنش پوستی و فلیبیت رگ در ناحیه تزریق شایع نیست.

شناسنامه محتوای آموزشی	
موضوع	مراقبت دارویی تاکسوتر
تهیه کننده	نگین عنایتی کارشناس پرستاری-سجاد وردی سوپروایزر آموزش
تایید کننده علمی	دکتر علی ابراهیمی
سمت	متخصص رادیولوژی و انکولوژی
تاریخ تهیه	1402
تاریخ بازنگری	1404
کد	MA-FO-09

بیمارستان فوق تخصصی آیت .ا. یشربی کاشان – واحد آموزش