


Cardiac catheterization

کاتریزاسیون قلبی (آنژیوگرافی)

آموزش به بیمار

آموزش زمان ترخیص



تعریف:

یک فرآیند تهاجمی است که شامل قراردادن یک لوله (کاتتر) قابل انعطاف با استفاده از اشعه ایکس در داخل شریان یا ورید محیطی و هدایت آن به سمت قلب است که جهت مشخص نمودن محل و میزان انسداد صورت میگیرد.

در طی آنژیوگرافی مایع مخصوصی (ماده حاجب) بوسیله کاتتر به داخل شریان تزریق میشود تا سرخرگ ها به شکل مطلوبی در عکس برداری با اشعه ایکس دیده شوند.

آنژیوگرافی به پزشک شما کمک میکند تا بررسی نماید که آیا شما نیاز به درمان هایی نظیر آنژیوپلاستی (بالون زدن و یا گذاشتن فنر یا استنت) ، جراحی بای پس کرونری یا درمان دارویی دارید یا خیر؟

سایر موارد استفاده:

۱-ارزیابی عضلات قلب و عملکرد دریچه های قلب

۲-اندازه گیری فشار سمت چپ و راست قلب

۳-درمان انفارکتوس حاد میوکارد

۴-تشخیص ناهنجاری های دریچه ای (نارسایی و تنگی)

۵-تشخیص آنومالی های مادرزادی قلب

۶-تشخیص علت و درمان بیماران دچار تپش قلب

در طی آنژیوگرافی چه اتفاقاتی روی میدهد؟

۱-جهت آرام بخشی به شما دارو داده میشود اما شما همچنان بیدار هستید

- ۲- پزشک ناحیه تحت عمل روی کشاله ران یا مچ دست شما را بیحس کرده و یک لوله باریک داخل سرخرگ شما کرده و به سمت قلب هدایت میکند.
- ۳- مایع مخصوصی (ماده حاجب) از طریق لوله (کنتر) تزریق میشود تا سرخرگ ها بصورت واضح در عکس برداری با اشعه ایکس دیده شوند تا وجود هرگونه مشکل تشخیص داده شود و اقدام مناسب درمانی صورت گیرد.
- ۴- ممکن است طی آنژیوگرافی پزشک از شما بخواهد که سرفه کنید یا نفس خود را نگه دارید.

احساساتی که ممکن است شما طی آنژیوگرافی تجربه کنید:

- ۱- اندکی فشار در هنگام وارد شدن کنتر
- ۲- به ندرت ممکن است حین تزریق مایع احساس ناراحتی در قفسه سینه داشته باشید
- ۳- تپش قلب ، گرمی، تهوع و احساس نیاز به ادرار کردن که ممکن است برای شما روی دهد ولی سرعت برطرف خواهند شد

مراقبت در منزل:

- ۱- احتمال وقوع کمی کیبودی در محل ورود کنتر وجود دارد پس نگران نباشید (چنانچه وسعت کیبودی افزایش یافت یا خونریزی وجود داشت به پزشک خود اطلاع دهید)
- ۲- خم شدن ، زورزدن ، بلند کردن وسایل سنگین و فعالیت های شدید مثل دویدن برای ۷ تا ۵ روز بعد از پروسیجر برای شما ممنوع است.
- ۳- دوش گرفتن پس از ۴۸ ساعت یا طبق دستور پزشک صورت گیرد(خودداری از حمام در وان)
- ۴- در صورت تورم، درد در محل ورود کنتر و یا احساس تب؛ حتما به پزشک خود اطلاع دهید
- ۵- مایعات فراوان مصرف کنید (با صلاحدید پزشک و چنانچه ممنوعیتی نداشته باشد برای دفع ماده حاجب و پیشگیری از نارسایی کلیوی)

شناسنامه محتوای آموزشی	
موضوع	خودمراقبتی در کنتریزاسیون قلبی
تهیه کننده	سجاد وردی سوپروایزر آموزشی
تایید کننده علمی	دکتر مازوچی
سمت	فلوشیپ اینترونشنال قلب
تاریخ تهیه	1402
تاریخ بازنگری	1404
کد	MA-FO-09