

## کربوپلاتین چیست ؟



یک داروی ضد سرطان است که جهت درمان انواع سرطان تجویز میشود مانند: کارسینومای تخمدان، سرطان سینه، سرطان مثانه، سرطان مری، سرطان های سر و گردن ، بیضه ، ریه ، تومورهای اولیه مغز ، لنفوم هوچکین و غیر هوچکین

## تعیین دوز دارو و تعداد دوره مصرف:

دوز دارو بر اساس وزن و قد بیمار و تعداد دوره آن بر اساس نوع ، شدت ، پیشرفت بیماری، فعالیت کلیوی، تعداد سلول خون و با نظر پزشک معالجتان تعیین میشود.

## شرایط نگهداری و نحوه تزریق دارو:

دارو در دوزهای ۵۰ و ۱۵۰ میلی گرم در شیشه های به رنگ تیره موجود است. محلول آن در دمای ۲ تا ۸ درجه تا ۲۴ ساعت و در دمای اتاق تا ۸ ساعت قابل نگهداری است. در سرم های دکستروز ۵٪ و نرمال سالین ۰/۹٪ قابل حل کردن و تزریق می باشد. به علت ناسازگاری دارو با آلومینیوم، به هیچ وجه سوزن و ست تزریق و سایر وسایل نباید از جنس آلومینیوم باشد. حساسیت شدیدی به نور دارد و دور از نور نگهداری کنید. در عرض ۱۵ تا ۶۰ دقیقه بایستی به شما تزریق گردد.

## تداخلات دارویی که با سایر داروها دارد :

**آمینو گلوکوزیدها :** باعث افزایش سمیت کلیوی و آسیب به کلیه ها می شود.  
**وارفارین :** باعث افزایش اثر وارفارین میشود و خطر خونریزی را افزایش میدهد.  
**فنی توئین :** باعث کاهش سطح سرمی فنی توئین و کاهش اثر آن میشود.

## واکسن آنفولانزا

\*در صورت مصرف داروهای فوق ، با پزشک معالجتان مشورت کنید.

کربوپلاتین جز داروهایی است که باعث آسیب به جنین میشود و در زنان باردار منع مصرف دارد.

در شیردهی تا کنون مواردی از انتشار به شیر مادر گزارش نشده است ولی به علت احتمال سمیت نوزاد در مادران تحت درمان شیر دهی قطع میشود.

مردان تا ۶ ماه پس از درمان با دارو نباید بچه دار شوند و توصیه میشود مردان جوان که قصد بچه دار شدن دارند قبل از شروع درمان با این دارو ذخیره اسپرم انجام دهند.

#### عوارض احتمالی مصرف دارو:

عوارض که در صورت مواجه با آنها شما بایستی به پزشک مراجعه کنید :

کاهش گلوبول سفید خون و کاهش نوتروفیل که باعث ایجاد تب ، لرز و سرفه در شما میشود.

کاهش پلاکت خون که باعث خونریزی ، کبودی غیر عادی ، مدفوع سیاه ، وجود خون در ادرار و مدفوع شما میشود.

واکنش شدید آلرژی و حساسیتی که به صورت راش های ناگهانی خارش دار در پوست ، تورم دست ها ، پاها ، لب ها و تورم گلو بروز پیدا میکند که باعث سختی در بلع و نفس کشیدن شما میشود.

#### عوارض شایع مصرف دارو :

خستگی ، درد معده ، تهوع و استفراغ ، تب ، گلودرد ، خس خس قفسه سینه ، گرگرفتگی ، ریزش مو، راش و خارش پوست ،

کاهش منیزیم، پتاسیم ، کلسیم و سدیم خون

شناسنامه محتوای آموزشی	
موضوع	مراقبت دارویی کربوپلاتین
تهیه کننده	خانم مهدیه غلامی پرستار - آقای سجاد وردی سوپروایزر آموزش
تایید کننده علمی	دکتر علی ابراهیمی
سمت	متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
تاریخ تهیه	1402
تاریخ بازنگری	1404

بیمارستان فوق تخصصی آیت الله...یثربی - واحد آموزش