

تعریف:

عدم نزول بیضه عبارت است از یک اختلال موجود در هنگام تولد که در آن یک یا دو بیضه از لگن به مکان طبیعی خود در کیسه بیضه نزول نکرده اند. 3٪ از نوزادان پسر رسیده و 30٪ از نوزادان پسر نارس دچار عدم نزول بیضه هستند. چنانچه قرار باشد بیضه خودبخود نزول کند تا 3 ماهگی در محل طبیعی قرار خواهد گرفت. با افزایش سن در بچه های مبتلا، احتمال ناباروری افزایش می یابد، احتمال بدخیمی و ضربه از عوارض دیگر می باشد. پس این عمل باید انجام شود و بیضه ها به محل طبیعی خودشان بازگردانده شوند زیرا بیضه ها نسبت به گرما بسیار حساس است و دمای داخل شکم هم به نسبت دمای کیسه بیضه بالاست. باقی ماندن بیضه ها در داخل شکم باعث خواهد شد که سلولهای تشکیل دهنده بیضه دچار آسیب شوند.

مراقبتهای بعد از عمل:

- 1- پیشگیری از عفونت، محل عمل حتی الامکان آلوده به ادرار و مدفوع نشود.
- 2- با استفاده از مسکن های تجویز شده درد کنترل شود.
- 3- از بازیهایی که نیاز به باز کردن پاها دارد و فعالیتهای شدید تا دو هفته بعد از عمل خودداری شود (جلوگیری از جابجایی بیضه)
- 4- سه روز بعد از عمل به صورت ایستاده دوش بگیرد.

علایم هشدار برای مراجعه به پزشک یا اورژانس بیمارستان:

- * در صورت بروز کبودی یا ورم زیاد در ناحیه بیضه ها
- * در صورت بروز تب 37/5 درجه به بالا یا مشاهده ترشحات چرکی از محل عمل

نکته: 2-3 هفته پس از عمل کمی ورم طبیعی است.

مراجعه به پزشک:

✓بخیه ها در ناحیه کیسه بیضه قابل جذب است و نیازی به کشیدن ندارد و برای کشیدن بخیه ها در ناحیه کشاله ران 7-10 روز بعد از عمل مراجعه کنید.

✓شش ماه بعد از نظر آتروفی بیضه معاینه شود.

✓تا سن پانزده سالگی سالی یکبار از نظر بدخیمی بررسی شود.

✓در صورت عدم تقارن بیضه ها به پزشک مراجعه شود.

شناسنامه محتوای آموزشی	
موضوع	خودمراقبتی در جراحی نهان بیضگی
تهیه کننده	مریم سادات سیدی تبار
تایید کننده علمی	دکتر حمیدرضا آرزو گر
سمت	جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری
تاریخ تهیه	1398
تاریخ بازنگری	1399
کد	MA-FO-09